

Avertissements agricoles

DLP 12 - 5 - 86050930

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

GRANDES CULTURES

N° 2 - 17 avril 1986

LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS
et les SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

APIONS : PREMIÈRES SORTIES MASSIVES

PHYTONOMES : PHASE DE MONTEE DES POPULATIONS

- 1 - EN ZONES PRÉCOCES COTIÈRES : DÉBUT DES TRAITEMENTS
- 2 - EN ZONES TARDIVES : ATTENDRE

Les SEUILS DE NUISIBILITE de 100 adultes (apions) et de 100 larves (phytonomes) commencent à être atteints en zones précoces cotières, plus particulièrement dans les secteurs de Bessan, Florensac, St Clément la Rivière.

En zones plus tardives ouest-audoise et nord-gardoise cette même situation ne devrait être approchée que dans une dizaine de jours.

TRAITEZ à l'aide d'une spécialité contenant du :

- lindane à 400-600 g/ha
- méthidathion à 300 g/ha (Ultracide)


RÉALISEZ le traitement après la précoupe si vous devez faire cette opération très prochainement

ligne blanche
dorsale



larve de phytonome

petite larve
vert-clair



Adulte de
3-4 mm bleu noir
métallique


Apion

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42



Les DEGATS sont d'autant plus à craindre que la végétation est peu développée.

CHAQUE PARCELLE EST UN CAS PARTICULIER



FILET FAUCHOIR



UTILISATION DU FILET

POUR INTERVENIR A LA DATE OPTIMALE FAITES LES
DENOMBREMENTS VOUS-MEMES DANS VOS PARCELLES
EN UTILISANT UN FILET FAUCHOIR (5 fois 5 coups)

MAÏS :

RAISONNEZ VOTRE DÉSHERBAGE (CF. DÉPLIANT SPV-AGPM)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX - MONTPELLIER 1986

© Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.